


OPS



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS
Américas



Directrices para la profilaxis
y el manejo de pacientes con
COVID-19
LEVE Y MODERADA
en América Latina y el Caribe

VERSIÓN RESUMIDA

26 de Agosto del 2021

NOTA A LOS LECTORES

Esta obra presenta los resultados de un proceso de elaboración rápida de directrices. La información incluida en esta directriz refleja la evidencia a la fecha publicada en el documento. La información y las recomendaciones se basan en la evidencia disponible y su calidad (sistema GRADE) en la fecha de publicación. Sin embargo, reconociendo que hay numerosas investigaciones en curso, la Organización Panamericana de la Salud actualizará de forma periódica la evidencia y las recomendaciones correspondientes.



Directriz para el cuidado de los pacientes infectados con covid-19 leve y moderado en américa latina y el caribe.

OPS/IMS/EIH/COVID-19/21-024

© **Organización Panamericana de la Salud, 2021.** Algunos derechos reservados. Esta obra está disponible en virtud de la licencia [CC BY-NC-SA 3.0 IGO](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/).



Con arreglo a las condiciones de la licencia, se permite copiar, redistribuir y adaptar la obra con fines no comerciales, siempre que se utilice la misma licencia o una licencia equivalente de Creative Commons y se cite correctamente, como se indica a continuación. En ningún uso que se haga de esta obra debe darse a entender que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) respalda una organización, producto o servicio específicos. No está permitido utilizar el logotipo de la OPS.

La OPS ha adoptado todas las precauciones razonables para verificar la información que figura en la presente publicación. No obstante, el material publicado se distribuye sin garantía de ningún tipo, ni explícita ni implícita. El lector es responsable de la interpretación y el uso que haga de ese material, y en ningún caso la OPS podrá ser considerada responsable de daño alguno causado por su utilización.



OBJETIVOS Y POBLACIÓN DIANA

Estas directrices de práctica clínica se elaboraron con el objetivo de proveer recomendaciones para el manejo de pacientes con COVID-19 leve y moderada, así como de personas en riesgo de infección por el SARS-CoV-2 en América Latina y el Caribe.

La población diana está constituida por personas en riesgo de infección por COVID-19, pacientes leves o moderados con sospecha diagnóstica o confirmada de COVID-19. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), es importante identificar los síntomas asociados a un cuadro clínico inicial de infección por el SARS-CoV-2 con COVID-19 leve y moderada, los cuales se presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro clínico

Los signos y síntomas de presentación inicial de la COVID-19 son diversos.

La mayoría de los pacientes presentan fiebre (83%-99%), tos (59%-82%), fatiga (44%-70%), disminución del apetito (40%-84%), disnea (31%-40%) y mialgias (11%-35%). También se ha descrito la presencia de síntomas inespecíficos como dolor de garganta, congestión nasal, cefalea, diarrea, náuseas y vómitos. Se ha observado además pérdida de la sensibilidad olfativa (anosmia) o gustativa (ageusia) que preceden al inicio de los síntomas respiratorios.

En particular, las personas mayores y los pacientes con inmunodepresión pueden presentar síntomas atípicos al inicio, como fatiga, disminución de la alteración del nivel de conciencia, reducción de la movilidad, diarrea y pérdida del apetito o estado confusional (delirium), sin que haya fiebre.

Puede haber un solapamiento de los síntomas de la COVID-19 con otros como disnea, algunos síntomas gastrointestinales o fatiga debidos a las adaptaciones fisiológicas en las mujeres embarazadas, a eventos adversos en el embarazo o a otras enfermedades, como la malaria.

En la población infantil, la fiebre o la tos pueden ser menos frecuentes que en los adultos.

Fuente: Organización Mundial de la Salud. COVID-19 Clinical management: living guidance. Washington, D.C.: OMS; 2021. Disponible en: <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-clinical-2021-1>.

La OMS presenta las siguientes definiciones para los pacientes con COVID-19 leve y moderada (OMS, 2021):

Enfermedad leve		Pacientes sintomáticos que cumplen los criterios de definición de caso de COVID-19 y no presentan signos de neumonía vírica ni de hipoxia. Los pacientes no presentan dificultad respiratoria ni disnea y las imágenes diagnósticas son normales.
Enfermedad moderada	Neumonía	Adolescente o adulto con signos clínicos de neumonía (fiebre, tos, disnea, respiración rápida), pero sin signos de neumonía grave, incluida una $SpO_2 \geq 90\%$ respirando aire ambiente Niño con signos clínicos de neumonía no grave (tos o dificultad para respirar y respiración rápida o retracción muscular) y sin signos de neumonía grave. Respiración rápida (medida en respiraciones/min): • <2 meses: ≥ 60. • 2-12 meses: ≥ 50. • 1-5 años: ≥ 40. Aunque el diagnóstico puede ser clínico, los estudios por imágenes de tórax (radiografía, TAC y ecografía) pueden ser útiles para el diagnóstico y la identificación o exclusión de complicaciones pulmonares. Los pacientes presentan $SpO_2 \geq 94\%$ a nivel del mar y a temperatura ambiente (en pacientes con niveles de saturación normales en la línea base) <i>Fuente: Organización Mundial de la Salud. COVID-19 Clinical management: living guidance. Washington, D.C.: OMS; 2021. Disponible en: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-clinical-2021-1.</i>

ALCANCE Y USUARIOS

Estas directrices de práctica clínica proveen recomendaciones basadas en la evidencia para la profilaxis de personas en riesgo de infección por el SARS-COV-2; para la identificación de marcadores y factores de riesgo de mortalidad de los pacientes con COVID-19 leve o moderado; el tamizaje de COVID-19; el manejo en el domicilio; el uso de imágenes diagnósticas para orientar el manejo; el tratamiento farmacológico; el uso de suplementos; la anticoagulación profiláctica, y los criterios de seguimiento y alta médica.

Las recomendaciones se dirigen a todo el personal de salud que atiende a los pacientes en el servicio de urgencias y en atención primaria (médicos generales, especialistas en medicina de urgencias, en neumología, en medicina interna, en medicina familiar y en infectología, así como terapeutas respiratorios y físicos, personal de enfermería y químicos farmacéuticos, entre otros). Las recomendaciones se dirigen a tomadores de decisiones y miembros de entidades gubernamentales relacionados con el manejo de pacientes con COVID-19.

Estas directrices no abordan aspectos relacionados con la nutrición y el manejo de complicaciones. Por otro lado, el manejo de los pacientes en estado crítico se trata en la *Guía para el cuidado de pacientes adultos críticos con COVID-19 en las Américas* publicado por la OPS, disponible en <https://iris.paho.org/handle/10665.2/53894>.

METODOLOGÍA

Estas directrices se elaboraron siguiendo métodos de elaboración de guías GRADE de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Para ello, se conformó un grupo de elaboración multidisciplinario compuesto por expertos en medicina de urgencias, infectología, anestesiología, pediatría, neumología, epidemiología, medicina intensiva y general, y salud pública. La coordinación técnica y metodológica estuvo a cargo de expertos de la OPS.

Se realizó un proceso de selección de las preguntas a incluir en las directrices, con el apoyo del grupo de elaboración. Se realizó una búsqueda sistemática de la literatura y la selección de la evidencia para cada pregunta PICO (Población, Intervención, Comparador, Desenlace). Posteriormente, se evaluó la calidad de los estudios incluidos y se crearon los perfiles de evidencia GRADE.

A continuación, se celebró una reunión virtual entre un panel de expertos iberoamericanos para formular las recomendaciones, considerando el contexto de implementación regional. Todos los miembros del grupo de elaboración de las directrices firmaron un formato de declaración de conflicto de intereses que analizó el grupo de orientación de la guía.

El detalle de la metodología puede consultarse en la versión ampliada de las directrices.

ACTUALIZACIÓN CONTINUA DE LAS DIRECTRICES

Estas directrices se encuentran en proceso continuo de actualización de la evidencia (*guía viva*) con el fin de proveer las recomendaciones más actualizadas para el manejo de los pacientes con un cuadro leve o moderado de COVID-19 y, en especial, para las posibles intervenciones de tratamiento farmacológico.

RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES

Cómo usar estas directrices

Cada pregunta clínica presenta un grupo de recomendaciones y de buenas prácticas que brindan orientaciones para el manejo de los pacientes con un cuadro leve o moderado de COVID-19.

Cada recomendación presenta la calidad de la evidencia según el sistema GRADE:

CALIDAD	CARACTERÍSTICAS
● ● ● ● Alta	Es muy poco probable que nuevos estudios cambien la confianza que se tiene en el resultado estimado.
● ● ● ○ Moderada	Es probable que nuevos estudios tengan un impacto importante en la confianza que se tiene en el resultado estimado y que estos puedan modificar el resultado.
● ● ○ ○ Baja	Es muy probable que nuevos estudios tengan un impacto importante en la confianza que se tiene en el resultado estimado y que estos puedan modificar el resultado.
● ○ ○ ○ Muy baja	Cualquier resultado estimado es muy incierto.

Las recomendaciones incluyen la fuerza de la recomendación según el sistema GRADE:

FUERTE	Debe realizarse. Es poco probable que nueva evidencia modifique la recomendación. Se recomienda hacerlo
CONDICIONAL	Podría realizarse. Nueva evidencia podría modificar la recomendación. Se sugiere hacerlo
FUERTE EN CONTRA	Podría no realizarse. Nueva evidencia podría modificar la recomendación. Se recomienda no hacerlo
CONDICIONAL EN CONTRA	Podría no realizarse. Nueva evidencia podría modificar la recomendación. Se sugiere no hacerlo
	Punto de buena práctica.

RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES PARA PACIENTES LEVES Y MODERADOS

PREGUNTA 1

¿CUÁL ES LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA PROFILAXIS EN PERSONAS EN RIESGO DE ADQUIRIR LA INFECCIÓN POR EL SARS-CoV-2?

N.º	RECOMENDACIÓN
1	Se recomienda no usar ningún medicamento para la profilaxis de personas en riesgo de infección por el SARS-CoV-2, fuera del contexto de los ensayos clínicos. Recomendación Fuerte. Calidad de la evidencia: moderada y muy baja

PREGUNTA 2

¿CUÁLES SON LOS FACTORES Y MARCADORES PRONÓSTICOS DE MORTALIDAD DE LOS PACIENTES CON COVID-19 GRAVE?

N.º	RECOMENDACIÓN
2	Para el manejo clínico de los pacientes con COVID-19 leve y moderada (incluidas las mujeres embarazadas), se recomienda tener en cuenta al menos uno de los siguientes factores de riesgo para la progresión de la enfermedad: adultos mayores, presencia de más de una comorbilidad, hipertensión, obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática crónica, enfermedad cerebrovascular, trombocitopenia, ser fumador activo, malnutrición en pacientes geriátricos, cáncer y enfermedades que causan inmunodeficiencia. Recomendación Fuerte. Calidad de la evidencia: moderada y baja
3	Para el manejo clínico de los pacientes pediátricos con COVID-19, se recomienda tener en cuenta como indicadores de progresión de la enfermedad la presencia de fiebre persistente, diarrea, dolor abdominal, náuseas o vómitos, así como el estado neurológico, las variaciones en la frecuencia cardíaca (en especial bradicardia acorde a la edad) y la saturación de oxígeno baja (de acuerdo a la edad y a la altitud). Recomendación Fuerte. Calidad de la evidencia: muy baja

	No existe evidencia de calidad que sustente el uso de las escalas pronósticas. El panel considera que pueden emplearse para orientar al personal de salud, preferiblemente las que se han validado en el medio local, enfocadas a los pacientes con COVID-19 que presentan factores de riesgo de progresión, con el fin de valorar la referencia a los servicios de salud, según su disponibilidad y las directrices institucionales. Es importante que el personal de salud reciba capacitación para el uso de la escala seleccionada y que considere que las escalas no reemplazan el juicio clínico. Punto de buena práctica
---	--

PREGUNTA 3

¿CUÁL ES LA ESTRATEGIA DE TRIAJE QUE DEBE UTILIZARSE PARA LOS PACIENTES CON COVID-19?

N.º	RECOMENDACIÓN
	Se recomienda que se implementen protocolos institucionales para el triaje de los pacientes con sospecha diagnóstica o confirmados con COVID-19, con el fin de clasificarlos de forma adecuada. La OPS ha publicado un Algoritmo de manejo de pacientes con sospecha de infección por el SARS-CoV- 2 en el primer nivel de atención y en zonas remotas de la Región de las Américas. Punto de buena práctica

PREGUNTA 4

¿CUÁL ES LA UTILIDAD DE LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS PARA ORIENTAR EL MANEJO DE LOS PACIENTES CON COVID-19?

N.º	RECOMENDACIÓN
	En pacientes con sospecha o diagnóstico confirmado de COVID-19 que presenten síntomas leves, con factores de riesgo y síntomas o signos de progresión de la enfermedad, se sugiere realizar estudios de imagen de tórax, además de la evaluación clínica y de pruebas de laboratorio, según la disponibilidad, para decidir su referencia a los servicios de salud. Recomendación Condicional. Calidad de la evidencia: baja

5	En pacientes con sospecha o diagnóstico confirmado de COVID-19 que no se encuentren hospitalizados y que presenten síntomas moderados se sugiere realizar estudios de imagen de tórax, además de la evaluación clínica y de pruebas de laboratorio, para decidir su referencia a los servicios de salud. Recomendación Condicional. Calidad de la evidencia: baja
6	En pacientes con sospecha o diagnóstico confirmado de COVID-19 que se encuentren hospitalizados y presenten síntomas moderados se sugiere realizar estudios de imagen de tórax, además de la evaluación clínica y de pruebas de laboratorio, para decidir el manejo terapéutico. Recomendación Condicional. Calidad de la evidencia: baja
✓	Se debe seleccionar la modalidad diagnóstica con base en el acceso, la evaluación clínica, el tipo de paciente, el diagnóstico diferencial, los factores de riesgo y los resultados de la escala de progresión de la enfermedad. Se sugiere utilizar preferiblemente la radiografía de tórax, la tomografía computarizada o la ecografía de pulmón según la disponibilidad. Punto de buena práctica

PREGUNTA 5

¿CUÁL ES LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE LAS INTERVENCIONES DIRIGIDAS AL MANEJO NO HOSPITALARIO DE LOS PACIENTES CON COVID-19 LEVE Y MODERADO?

N.º	RECOMENDACIÓN
7	Se recomienda aislar a los pacientes con sospecha o diagnóstico confirmado de COVID-19 leve y moderada para mitigar la transmisión del virus a personas cercanas. Esto se puede hacer en el domicilio o, en el caso de los pacientes que no pueden aislarse en su casa o con factores de riesgo de complicación, en espacios seleccionados a tal fin (hospitalarios o comunitarios, entre otros). Recomendación Fuerte. Calidad de la evidencia: muy baja
8	Se recomienda que los pacientes con COVID-19 reciban tratamiento sintomático ambulatorio de acuerdo a los síntomas predominantes (fiebre, dolor de garganta, cefalea, tos, rinorrea, mialgias), prioritariamente con antipiréticos en dosis bajas, y que mantengan una nutrición y rehidratación adecuadas a sus necesidades. Recomendación Fuerte. Calidad de la evidencia: baja
✓	Los pacientes con COVID-19 deben recibir consejería acerca de las señales de alarma, las complicaciones de la infección y en qué casos deben buscar ayuda en los servicios de emergencia. Punto de buena práctica

9	Se recomienda que los pacientes sintomáticos con COVID-19 moderado y con factores de riesgo de progresión a enfermedad grave que no estén hospitalizados usen pulsioxímetros en su domicilio para monitorear su nivel de saturación de oxígeno (SpO₂). Se debe capacitar al paciente para su uso adecuado y para que busque asistencia médica cuando se evidencie disminución de la SpO₂ (de acuerdo a la altitud) o presenten indicios de dificultad respiratoria independiente de la SpO₂. Recomendación Condicional. Calidad de la evidencia: muy baja
10	Se sugiere monitorizar a los pacientes con COVID-19 moderado manejados en su domicilio con el fin de identificar signos y síntomas de progresión de la enfermedad, incluido el uso de pulsioximetría. Este seguimiento puede realizarlo a distancia el personal de salud mediante dispositivos electrónicos (telesalud) o mediante asistencia domiciliaria, según la disponibilidad. Recomendación Condicional. Calidad de la evidencia: muy baja

MANEJO DE MUJERES EMBARAZADAS Y POBLACIÓN PEDIÁTRICA

N.º	RECOMENDACIÓN
✓	Para el manejo de las mujeres embarazadas y la población pediátrica con COVID-19 leve y moderada, se deben seguir las mismas recomendaciones de aislamiento y monitorización de las señales de deterioro que para la población general. Las madres no deben separarse de sus hijos pequeños durante el aislamiento, a menos que la madre esté muy enferma para cuidarlos. Punto de buena práctica
✓	Las mujeres embarazadas deben tener un acceso fácil a servicios de ginecología y obstetricia, medicina fetal, cuidado neonatal y salud mental en caso de complicaciones maternas o neonatales. Punto de buena práctica
11	Se recomienda que las madres con sospecha o diagnóstico confirmado de infección por el SARS-CoV-2 continúen con la lactancia materna y sigan en contacto con sus hijos infantiles dado que los beneficios superan a los riesgos en las pacientes con cuadros leves y moderados. No obstante, deben usar una mascarilla, en especial en el momento de la lactancia. Recomendación Fuerte. Calidad de la evidencia. Muy baja

INTERVENCIONES NO FARMACOLÓGICAS PARA EL MANEJO DE LA ANSIEDAD DE LOS PACIENTES LEVES Y MODERADOS

N.º	RECOMENDACIÓN
12	Se sugiere que los pacientes con COVID-19 leve o moderado practiquen técnicas de relajación musculares y respiratorias, según la necesidad y disponibilidad, con el fin de reducir la ansiedad durante el aislamiento. Es necesario capacitar al paciente y al personal de salud. Recomendación Condicional. Calidad de la evidencia. Baja

PREGUNTA 6

¿CUÁL ES LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE LAS INTERVENCIONES FARMACOLÓGICAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES LEVES Y MODERADOS CON COVID-19?

N.º	RECOMENDACIÓN
13	Se recomienda no administrar remdesivir, colchicina, plasma convaleciente, lopinavir + ritonavir, aspirina, ivermectina, cloroquina e hidroxiquina, con o sin azitromicina, acetilcisteína, tocilizumab, ni ningún otro medicamento para el manejo de los pacientes con COVID-19 leve y moderado. Recomendación Fuerte en contra. Calidad de la evidencia: baja y muy baja <i>Nota: En el cuerpo de la evidencia y los algoritmos se presenta la calidad de la evidencia para cada intervención. El panel de expertos no evaluó algunos medicamentos en esta versión de las directrices (como REGEN-COV) puesto que no estaban disponibles en Latinoamérica y el Caribe en el momento de la evaluación.</i>
14	No se recomienda administrar ivermectina para el tratamiento de pacientes con COVID-19 leve o moderada, fuera del contexto de ensayos clínicos. Recomendación Fuerte en contra. Calidad de la evidencia: baja y muy baja
15	Se recomienda no administrar antibióticos a pacientes con sospecha o diagnóstico confirmado de COVID-19 leve o moderado sin sospecha de infección bacteriana sobreagregada. Recomendación Fuerte en contra. Calidad de la evidencia: baja
16	Se recomienda no administrar corticoesteroides para el manejo de los pacientes con COVID-19 leve o moderado. Recomendación Fuerte en contra. Calidad de la evidencia: moderada
✓	El tratamiento de coinfecciones debe realizarse con base en la confirmación diagnóstica y el criterio clínico, siguiendo los protocolos institucionales. Punto de buena práctica

PREGUNTA 7

¿CUÁL ES LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE LOS SUPLEMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES LEVES Y MODERADOS CON COVID-19?

N.º	RECOMENDACIÓN
17	Se recomienda no administrar vitamina D para el tratamiento de los pacientes con COVID-19 leve o moderado, fuera del contexto de ensayos clínicos. Recomendación Fuerte en contra. Calidad de la evidencia: muy baja
18	No se recomienda administrar dióxido de cloro para el tratamiento de los pacientes con COVID-19 leve o moderado. Recomendación Fuerte en contra. No se encontró evidencia.

PREGUNTA 8

¿CUÁL ES LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA PROFILAXIS FARMACOLÓGICA CON ANTICOAGULANTES DE LOS PACIENTES CON COVID-19 LEVE Y MODERADO?

N.º	RECOMENDACIÓN
	La profilaxis farmacológica con anticoagulantes en pacientes con COVID-19 leve y moderado debe individualizarse de acuerdo a la historia clínica, los factores de riesgo de tromboembolismo y los protocolos institucionales. Punto de buena práctica
	Para los pacientes que reciben anticoagulantes orales en el momento de adquirir la infección, se sugiere continuar con el tratamiento establecido según indicación previa. Punto de buena práctica


PREGUNTA 9

¿CUÁL ES EL ESQUEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES CON COVID-19 LEVE Y MODERADO?

N.º	RECOMENDACIÓN
19	Para los pacientes con COVID-19 cuyos síntomas han mejorado, se sugiere realizar una evaluación integral y verificar que no necesitan soporte respiratorio y manejo de fluidos para tomar la decisión de alta médica o de manejo en el domicilio. Recomendación Fuerte. Calidad de la evidencia: muy baja
20	Se recomienda que los pacientes que cumplen los criterios de alta cuenten con un plan de salida que incluya un resumen del diagnóstico, medicamentos (si es pertinente) y cuidados. Se sugiere proporcionar información sobre el plan al paciente y a la familia. Recomendación Fuerte. Calidad de la evidencia: muy baja
21	En los pacientes que se han recuperado de la infección por el SARS-CoV-2, se recomienda no programar imágenes diagnósticas en el momento del alta hospitalaria. A medida que se realiza el seguimiento, se programará el uso de imágenes diagnósticas según las necesidades del paciente y la disponibilidad con el fin de identificar posibles secuelas de la enfermedad. Recomendación Fuerte. Calidad de la evidencia: muy baja
	Los pacientes que hayan recibido el alta hospitalaria o los pacientes manejados en su domicilio y que muestran síntomas persistentes, complicaciones o limitaciones funcionales, deben ser para determinar la presencia de deterioro físico, cognitivo o mental, y se deben manejar de acuerdo a la alteración o alteraciones identificadas. Su seguimiento puede realizarse presencialmente o mediante teleconsulta. Punto de buena práctica
	Debe realizarse un programa de rehabilitación desde la salida hasta el largo plazo; realizando referencia a los servicios o centros especializados de rehabilitación designados para atender los pacientes con COVID-19. Se considerará la posibilidad de realizar las actividades programadas de forma virtual. Punto de buena práctica
	Los programas de rehabilitación deben ejecutarlos equipos multidisciplinarios y estar orientados hacia las necesidades y metas de los pacientes, que incluyen terapia física; educación y consejo en estrategias de autocuidado; evaluación de salud mental técnicas respiratorias; apoyo a cuidadores; grupos de apoyo, manejo del estrés y modificaciones en el domicilio. Punto de buena práctica
	En el caso de las mujeres embarazadas que se hayan recuperado de la COVID-19, se debe continuar su cuidado prenatal o de posparto de acuerdo a lo programado. Punto de buena práctica

ALGORITMOS

FLUJOGRAMA GESTIÓN CLÍNICA COVID-19



COVID-19, enfermedad por el nuevo coronavirus; SARS-CoV-2, coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo; TAC; tomografía computarizada.

A. Síntomas comunes

- Fiebre.
- Tos, con esputo o sin él.
- Falta de aire.
- Dolores musculares (mialgias).
- Fatiga.
- Náuseas y vómitos.
- Resfriado.
- Diarrea.
- Dolor de cabeza.
- Dolor de garganta.
- Erupción vasculítica.

B: Signos de enfermedad grave

- Frecuencia respiratoria >30 respiraciones/minuto.
- Hipotensión.
- Arritmia.
- Evidencia de disnea (retracción muscular, cervical o intercostal; aleteo nasal; cianosis; saturación de oxígeno <94% o según criterio clínico).

Población pediátrica

- Fiebre persistente, diarrea, dolor abdominal, náusea/vómito, estado neurológico, variaciones en la frecuencia cardíaca (especialmente bradicardia acorde a la edad) y baja saturación de oxígeno.

C. Factores de riesgo

- Arteroesclerosis.
- Cáncer.
- Diabetes.
- Sexo masculino.
- Enfermedad cardiovascular.
- Enfermedad hepática.
- Enfermedad neurológica.
- Enfermedad pulmonar.
- Enfermedad renal.
- Hipertensión.
- Inmunodeficiencia por cualquier causa.
- Obesidad.
- Personas mayores de 60 años.
- Embarazado.
- Malnutrición.

D: Exámenes de laboratorio rutinarios según disponibilidad

- Muestras respiratorias para detección viral de SARS-CoV-2.
- Función hepática.
- Hemograma.
- Otras pruebas de laboratorio basadas en la epidemiología local (gripe, otras infecciones respiratorias, dengue y malaria).
- Análisis de orina.

Exámenes de laboratorio adicionales según disponibilidad

- Procalcitonina.
- Creatininas.
- Dímero D y fibrinógeno.
- Proteína C reactiva.

Estudios de diagnóstico por imágenes según disponibilidad

- Radiografía de tórax.
- TAC de tórax.

E: Señales de deterioro

- Aumento de la dificultad respiratoria.
- Disminución de la presión arterial.
- Coloración azul en labios y rostro.
- Confusión o incapacidad para levantarse.
- Debilidad aumentada.
- Disminución de la saturación de oxígeno por debajo de 90%.
- Dolor persistente en el pecho.
- Enrojecimiento o inflamación de las extremidades.
- Mareo.
- Pérdida del conocimiento.
- Frecuencia respiratoria >20 respiraciones/minuto.

PROFILAXIS Y MANEJO DE PACIENTES CON COVID-19 LEVE O MODERADO

PROFILAXIS

No usar ningún medicamento para la profilaxis de personas de riesgo de infección por COVID-19.

MANEJO DE PACIENTE LEVE

Los pacientes deben aislarse y recibir solamente tratamiento sintomático ambulatorio de acuerdo a los síntomas predominantes (fiebre, dolor de garganta, cefalea, tos, rinorrea, mialgias). También deben recibir información sobre las señales de alarma que indican búsqueda de atención médica.

MANEJO DE PACIENTE MODERADO




Los pacientes deben aislarse y recibir tratamiento sintomático, usar pulsoxímetros (si se encuentran disponibles) y recibir información sobre las señales de alarma que indican búsqueda de atención médica.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO


No se recomienda administrar tratamiento con ningún medicamento (ivermectina, hidroxiquina, antibióticos, esteroides, entre otros) para el manejo de pacientes con COVID-19 leve y moderado.

SUPLEMENTOS

No se recomienda administrar ningún suplemento como vitamina D o dióxido de cloro para el manejo de pacientes con COVID-19 leve y moderado.



ALGORITMO DE MANEJO DE INFECCIÓN POR COVID-19 EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN Y ZONAS REMOTAS



GUÍAS DE OPS Y OMS DE SOPORTE A ESTE DOCUMENTO

USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN

- Requerimientos para uso de equipos de protección personal (EPP) para el nuevo coronavirus (2019-nCoV) en establecimientos de salud.

<https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51905/requirements-%20PPE-coronavirus-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

- Especificaciones técnicas de dispositivos médicos para la gestión de casos de COVID-19 en los servicios de salud.

<https://www.paho.org/es/documentos/especificaciones-tecnicas-dispositivos-medicos-para-gestion-casos-covid-19-servicios>

- Presentation: Infection Prevention and Control and novel coronavirus (COVID-19): standard precautions and use of personal protective equipment.

<https://www.paho.org/en/documents/presentation-infection-prevention-and-control-and-novel-coronavirus-covid-19-standard>

- Interim laboratory biosafety guidelines for the handling and transport of samples associated with the novel coronavirus 2019 (2019-nCoV).

<https://www.paho.org/en/documents/interim-laboratory-biosafety-guidelines-handling-and-transport-samples-associated-novel>

- Infection prevention and control during health care when novel coronavirus (nCoV) infection is suspected.

[https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-\(ncov\)-infection-is-suspected-20200125](https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125)

- Ventilación natural para el control de las infecciones en entornos de asistencia de la salud.

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2011/ventilacion_natual_spa_25mar11.pdf

DIAGNÓSTICO DE COVID-19

- Coronavirus disease (COVID-19) technical guidance: Laboratory testing for 2019-nCoV in humans.

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/laboratory-guidance/>

- Laboratory testing for 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) in suspected human cases.

<https://www.who.int/publications-detail/laboratory-testing-for-2019-novel-coronavirus-in-suspected-human-cases-20200117>

- Guidance for laboratories shipping specimens to WHO reference laboratories that provide confirmatory testing for COVID-19 virus.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331639/WHO-2019-nCoV-laboratory_shipment-2020.3-eng.pdf

TRATAMIENTO

- COVID-19 Clinical management: living guidance.

<https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-clinical-2021-1>

- Home care for patients with suspected novel coronavirus (2019-nCoV) infection presenting with mild symptoms and management of contacts.

[https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-\(ncov\)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts](https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts)

- Lista de medicamentos esenciales para el manejo de pacientes que ingresan a las unidades de cuidados intensivos con sospecha o diagnóstico confirmado de COVID-19. Actualización, 10 de agosto del 2020.

[https://iris.paho.org/handle/10665.2/52603.List of Priority Medical Devices in the Context of COVID-19](https://iris.paho.org/handle/10665.2/52603.List%20of%20Priority%20Medical%20Devices%20in%20the%20Context%20of%20COVID-19), 13 de agosto del 2020

<https://iris.paho.org/handle/10665.2/52580>

- Algoritmo de manejo de pacientes con sospecha de infección por COVID-19 en el primer nivel de atención y en zonas remotas de la Región de las Américas, julio del 2020.

<https://iris.paho.org/handle/10665.2/52501>

• MONITOREO GLOBAL DE LA COVID-19

- Public Health surveillance for COVID-19: Interim guidance

[https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-\(2019-ncov\)](https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov))

- Revised case report form for Confirmed Novel Coronavirus COVID-19 (report to WHO within 48 hours of case identification), 27 de febrero del 2020.

<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331234/WHO-2019-nCoV-SurveillanceCRF-2020.2-eng.pdf>

ALTA DE LOS PACIENTES RECUPERADOS

- Clinical management of severe acute respiratory infection when novel coronavirus (2019-nCoV) infection is suspected.

<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330893/WHO-nCoV-Clinical-2020.3-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

- Novel coronavirus (SARS-CoV-2): Discharge criteria for confirmed COVID-19 cases – When is it safe to discharge COVID-19 cases from the hospital or end home isolation?

<https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-Discharge-criteria.pdf>

CONSIDERACIONES DE INVESTIGACIÓN Y DE LOS SERVICIOS DE SALUD

- Considerations for Strengthening the First Level of Care in the Management of the COVID-19 Pandemic.

<https://iris.paho.org/handle/10665.2/53190>

- Considerations in the investigation of cases and clusters of COVID-19.

<https://www.who.int/publications-detail/considerations-in-the-investigation-of-cases-and-clusters-of-covid-19>

- Operational considerations for case management of COVID-19 in health facility and community: Interim guidance, 19 de marzo del 2020.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331492/WHO-2019-nCoV-HCF_operations-2020.1-eng.pdf

- Reorganization and Progressive Expansion of Health Services for the Response to the COVID-19 Pandemic. Technical Working Document, 27 de marzo del 2020.

<https://iris.paho.org/handle/10665.2/52215>

- Severe Acute Respiratory Infections Treatment Centre: Practical manual to set up and manage a SARI treatment centre and a SARI screening facility in health care facilities, marzo del 2020.

<https://www.who.int/publications-detail/severe-acute-respiratory-infections-treatment-centre>

- COVID-19 v4. Operational Support & Logistics. Disease Commodity Packages.

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/dcp-ncov-v4.pdf?sfvrsn=f5fe6234_7

- Recommendations for Implementing the CICOM Methodology during the COVID-19 Response. Version 3.1, 10 de junio del 2020.

<https://iris.paho.org/handle/10665.2/52376>

MANEJO DE CADÁVERES

- Manejo de cadáveres en el contexto del nuevo coronavirus (COVID-19)

<https://iris.paho.org/handle/10665.2/52000>

GRUPO DESARROLLADOR

GRUPO COORDINADOR

El grupo coordinador de la OPS está compuesto por Ludovic Reveiz, Asesor del departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción de Salud y del equipo del Sistema de Gestión de Incidente para la respuesta a COVID-19 de la OPS; y João Toledo, Asesor del departamento de Emergencias de Salud y del equipo del Sistema de Gestión de Incidente para la respuesta a COVID-19 de la OPS.

METODÓLOGOS

Marcela Torres y Ariel Izcovich, consultores del Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción de Salud y del equipo del Sistema de Gestión de Incidente para la respuesta a COVID-19 de la OPS.

PANEL DE EXPERTOS

El panel de expertos está compuesto por Graciela Josefina Balbin, Ministerio de Salud de Perú; Elías J. Bonilla V, Médico Pediatra, Ministerio de Salud/Caja del Seguro Social de Panamá; Lourdes Carrera Acosta, Médico Especialista de Gestión en Salud, Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI), EsSalud, Lima, Perú; Denis Escobar, Jefe de urgencias del Hospital Regional Nicolás A. Solano de Panamá. Fabián Jaimes, Profesor del Departamento de Medicina Interna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquía, Editor Coordinador de IATREIA, Colombia; Juan Carlos Meza, Delegado Académico del Programa de Segunda Especialización en Medicina Humana-Residentado Médico de la FMH-USMP Faculty ACLS, PHTLS e Instructor PALS, AMLS de la AHA-PLST, Instructor FCCS, FDM y MCCRC de la SCCM-SOPEMI de Perú; José Montes Alvis, Médico Epidemiólogo, Dirección de Guías de Práctica Clínica, Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI), EsSalud, Lima, Perú; Jose F. Parodi, Universidad de San Martín de Porres, Facultad de Medicina, Centro de Investigación del Envejecimiento, Lima, Perú; Sonia Restrepo, Neumóloga Pediatra, Profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, Hospital Fundación la Misericordia y Hospital Universitario San Ignacio en Colombia; Ojino Sosa, Especialista en Medicina Interna y Medicina Crítica, Titular de la División de Educación Continua, Coordinación de Educación en Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Adscrito al Hospital Médica Sur en México; Ho Yeh Li, Coordinadora UTI-DMIP, Hospital das Clínicas-FMUSP, Brasil; Edgard Díaz Soto, Especialista en Medicina de Urgencias, Maestro en Administración en Servicios de Salud, Médico adscrito al servicio de Urgencias del Hospital General de Zona Número 8, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), México y Dr. Andrés Viteri García, Director Nacional de Normatización - Ministerio de Salud Pública del Ecuador, Docente Investigador - Universidad UTE, Centro de Investigación de Salud Pública y Epidemiología Clínica (CISPEC).

REVISORES PARES

Rodrigo Pardo, Instituto de Investigaciones Clínicas, Universidad Nacional de Colombia. Jairo Méndez y Luis de la Fuente, asesores del departamento de Emergencias de Salud y del equipo del Sistema de Gestión de Incidente para la respuesta a COVID-19 de la OPS; y José Luis Castro, Alexandre Lemgruber, y Francisco Caccavo asesores del departamento de Sistemas y Servicios de Salud de la OPS.



OPS



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas